

## **BETADINE® ANTISEPTIC OINTMENT**

Salap antiseptik untuk membunuh kuman penyebab infeksi pada luka seperti luka bakar, terpotong, luka sunat, luka tergores, dan luka kecil lainnya.

Mengandung Povidone-Iodine 10% w/v

### **Cara Penggunaan:**

Oleskan BETADINE® Antiseptic Ointment satu atau dua kali dalam sehari pada seluruh permukaan luka.

### **Jangan menggunakan BETADINE®:**

- Jika Anda alergi terhadap povidone iodine atau bahan lainnya dalam produk ini
- Jika Anda penerima atau saat ini sedang menerima pengobatan Radioiodine
- Jika Anda pengguna produk mengandung merkuri seperti thiomersal
- Jika Anda memiliki gangguan tiroid
- Pada anak di bawah usia 1 tahun

Konsultasikan dengan dokter sebelum penggunaan:

- Jika Anda hamil atau menyusui
- Jika Anda sudah menerima pengobatan Radioiodine pada 4 minggu terakhir
- Pada anak berusia 1-2 tahun

Konsultasikan dengan dokter jika:

- Gejala tidak membaik atau memburuk
- Anda mengalami alergi atau iritasi kulit seperti kemerahan, lecet kecil, gatal atau ruam yang dapat terjadi dengan cepat.

### **Efek Samping**

• **BETADINE®** dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi dan perubahan warna kulit, kemerahan, bengkak, lecet kecil, gatal, atau kulit kering, kelelahan, kelemahan, kebingungan, napas dangkal, buang air kecil sedikit atau tidak sama sekali, retensi cairan, pembengkakan kaki dan pergelangan kaki.

**Segera hubungi dokter jika mengalami** salah satu gejala atau tanda:

- Reaksi alergi yang muncul cepat dan termasuk gatal ruam kulit, ruam badan, gangguan napas mendadak, rasa ingin pingsan, pembengkakan mulut, wajah, bibir, lidah atau tenggorokan – **segera cari pertolongan medis**
- Gejala gangguan tiroid termasuk merasa gelisah, muram, susah tidur, tangan gemetar, detak jantung cepat atau tidak teratur, kesulitan bernapas, merasa sangat panas atau berkeringat, penurunan dan penambahan berat badan, kelelahan.

### **Cara Penyimpanan**

- Simpan di bawah suhu 30°C dan terlindung dari cahaya
- Jangan digunakan setelah tanggal kadaluarsa
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- Jika tidak sengaja tertelan atau terkena mata, segera hubungi dokter.

**HANYA UNTUK PEMAKAIAN LUAR**

**Kemasan:**

Dus, isi 1 tube @ 5 g; 10 g; 20 g  
KEMENKES RI PKD 20501710037

## Diproduksi oleh:

PT. Mahakam Beta Farma  
Jakarta – Indonesia

## Didistribusikan oleh:

PT. Mundipharma Healthcare Indonesia  
Generali Tower 20<sup>th</sup> Fl  
Gran Rubina Business Park  
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-22  
Jakarta 12940 Indonesia

*BETADINE® is a Registered Trademark of Mundipharma.*